

농장에 이득이 되는 좋은 습관

바이콕스 5% (Baycox 5% oral suspension)



성분 및 함량
본제 1L중
Toltrazuril

50g

포장단위
100mL

바이콕스 5%는 돼지 콕시듐증의 원인체인 *Isospora suis*에 효과가 입증된 전 세계적으로 자돈에게 최초로 허가된 항콕시듐증 예방 및 치료제입니다.

1) 단 1회 투여로 치료가 됩니다.

바이콕스 5%는 단 1회 투여로도 설사 증상이 멈추는 높은 치료 효과를 보입니다.

2) 효과가 빠르고 강력합니다.

3) 전 세계 최초로 자돈 콕시듐증 치료제로 허가된 제품입니다.

4) 3일령에 프로롱갈(철분주사)과 병용 투여하여도 효과적입니다.

바이콕스 5%를 예방적으로 사용시 3일령에 프로롱갈과 병용 투여가 가능합니다.

5) 자돈의 콕시듐 면역 형성에 도움이 됩니다.

바이콕스 5%는 자돈이 콕시듐 원충 감염시 획득하는 자체 면역 형성을 저해하지 않습니다. 또한, 재감염시 무투여군에 비해 현저히 적은 콕시듐 총란 배출을 보입니다.

6) 액상 제제라 투여가 간편합니다.

액상 형태의 제제로 쉽게 구강으로 투여할 수 있습니다.

7) 송아지 콕시듐증 치료에도 우수합니다.

1번의 투여로 콕시듐증을 간단하게 예방/치료할 수 있습니다.

■ 효능 및 효과

가. 대상축종 : 자돈, 송아지

나. 콕시듐의 감염에 의한 자돈의 설사 예방 및 치료

다. 송아지의 콕시듐증 예방과 치료

■ 용법 및 용량

가. 3~7일령 자돈에 바이콕스 5% 현탁액 1mL를 1회 경구로 투여합니다.

나. 송아지 (5~6주령)는 체중 10kg당 3.0mL를 1회 경구로 투여합니다.

■ 주의사항

* 휴약기간 : 자돈, 송아지 70일

* 안전성 및 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 약제와 함께 희석하여 사용하지 마시오.

* 송아지에게 사용시 물, 전해질액 또는 대용유로 혼합한 후 경구로 투약하십시오.

* 사용 전에 제품을 충분히 흔들어 주십시오.

■ 저장방법/유효(사용)기간

* 직사광선을 피하여 실온(1~30°C)의 어두운 곳에 보관하십시오.

* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 36개월

