

카토살 경구용 (Catosal oral solution)



성분 및 함량

본제 1L중

Butaphosphan

100g

Cyanocobalamin

50mg

포장단위

1L

카토살 경구용은 각종 질병과 스트레스로 인하여 발생하는 활력 저하를 신속하게 개선시켜 동물 스스로 회복하는 능력을 향상시켜 줍니다.

- 1) 신진 대사 작용을 촉진시켜 무기력증, 활력 저하를 신속히 개선시켜 줍니다.
- 2) 각종 영양소의 이용률을 높여주고 혈액 생산 및 어린 동물의 성장을 촉진합니다.
- 3) 바이러스 질병으로 인한 활력 저하시 특히 효과가 좋습니다.
- 4) 영양 불균형, 질병 후유증, 탈수 등으로 인하여 발생하는 2차적인 빈혈을 신속하게 개선합니다.

효능 및 효과

가. 대상동물 : 닭

사료효율 개선, 증체 개선(성장촉진), 활력 증진, 산란율 및 난각질 개선, 폐사율 감소, 스트레스시 저항력 증진, 카니발리즘 예방, 환우기간 단축

나. 대상동물 : 넓치

사료효율 개선, 활력 증진, 폐사율 감소, 면역 증강, 스트레스시 저항력 증진, 신진 대사 및 증체개선

용법 및 용량

가. 닭 : 음수에 희석하여 경구 투여합니다.

- 산란계, 종계 0.5mL/수, 2~7일간

- 육계 0.3mL/수, 5일간

1) 만성 질병 및 건강한 동물(성계수당)

- 산란계, 종계 0.25mL

- 육계 0.15mL

2) 1일 투약 조건표

구분	투여량(1,000수)	
		초생주
산란계	중/대추	150mL
	성계	250mL
육계	초생주 전기	100mL
	후기	150mL

다. 넓치 : 어체 톤당 본제 100mL(어체 kg당 0.1mL로 부타포스판 10mg에 해당)을 5일간 경구 투여합니다.

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 오/남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법/용량을 준수하고, 동시에 동일 성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.
- * 지정된 어종, 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- * 피부나 눈에 접촉시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 18개월

