

비간톨 E (Vigantol-E inj)



비간톨-E는 3종의 비타민(A, D3, E)이 고단위로 농축되어 있어 해당 비타민 부족시 발생할 수 있는 여러 가지 문제점을 효과적으로 해결할 수 있고 투여량이 소량이므로 주사하기가 용이하며 개체별로 정확한 용량을 투약할 수 있습니다.

1) 지속성 비타민 A, D3, E 제제입니다.

지용성, 고농축, 지속성을 가진 주사용 비타민제로 서서히 흡수됩니다.

2) 암컷의 번식성적 향상과 수컷의 생식기능을 강화시킵니다.

수컷의 성욕 및 정자 생성 능력을 증진시키고, 태아사망 예방, 태아발육 촉진, 유산을 방지합니다.

3) 신생가축의 항병력을 강화합니다.

비간톨-E는 비타민이 부족할 때 발생하는 구루병, 골연화증을 예방 및 치료합니다.

성분 및 함량

본제 1mL중	
Vitamin A Palmitate	300,000IU
Vitamin D ₃	100,000IU
Vitamin E acetate	50mg

포장단위

50mL

효능 및 효과

- 가. 비타민 결핍증의 예방 및 치료
- 나. 영양성 질병으로부터의 회복촉진
- 다. 모축의 성욕증진 및 정자생산능력의 증진
- 라. 돼지의 경우 출생시의 사망률 감소
- 마. 어린 동물의 구루병 및 성숙한 동물의 골연증 예방 치료
- 바. 영양불량 또는 부적절한 사료급여에 의한 대사 장애
- 사. 활은 병의 치료
- 아. 태아의 발육촉진 및 신생축의 항병력 증가
- 자. 유산 방지
- 차. 이외의 심장근육부진, 송아지의 백근병, 자돈의 근육괴사증, 돼지의 심장기능 부전, 비육기에 어유의 지나친 급여로 나타나는 누린 지방의 축적 예방 등을 위하여 사용

용법 및 용량

다음 용량으로 근육 깊숙이 또는 정맥 내로 서서히 주사합니다. 심한 경우에는 9~10일 후에 동량을 반복 투여합니다.

가. 암소/암말/임신돈	5mL
나. 황소/수말/수돼지	5mL
다. 송아지/망아지	3mL
라. 돼지/면양/산양	2mL
마. 자돈/강아지	1mL

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 오/남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법/용량을 준수하십시오.
- * 본 제품에서 이물질이 발견될 경우에는 사용하지 마십시오.
- * 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 36개월

