

# 카토살 (Catosal inj)



**성분 및 함량**  
 본제 1mL중  
 Butaphosphan 100mg  
 Vitamin B12 0.05mg

**포장단위**  
 100mL

카토살은 각종 질병과 스트레스로 인하여 발생하는 활력 저하를 신속하게 개선시켜 주어 가축 스스로 회복하는 능력을 향상시켜 줍니다.

**1) 효과적인 보조 치료제입니다.**  
 카토살은 가축 체내 거의 모든 대사과정을 촉진시킵니다. 질병치료시 효과적인 보조치료제입니다.

**2) 신진 대사 작용을 촉진시켜 줍니다.**  
 카토살에 함유되어 있는 유기인 화합물은 가축의 신진 대사 작용을 촉진시켜 주어 질병 또는 스트레스시 나타나는 무기력증, 활력 저하를 개선시켜 줍니다.

**3) 각종 영양소의 이용률을 높여주고 혈액 생산 및 어린 동물의 성장을 촉진합니다.**  
 카토살의 비타민 B12는 탄수화물, 지방, 단백질 대사를 촉진하여 각종 영양소의 이용률을 높여주며, 적혈구의 생산을 촉진하여 혈액 생산을 촉진하고 어린 동물의 성장 또한 촉진시켜 줍니다.

**4) 바이러스 질병으로 인한 활력 저하시 특히 효과가 좋습니다.**  
 항생제 치료에 효과가 없는 바이러스성 질병으로 인한 활력 저하시 카토살은 식욕을 증진시켜 주고 활력을 개선시켜 동물 자체의 항병성을 높여주어 빠른 치유에 도움을 줍니다.

### 효능 및 효과

- 가. 급성 질병 및 급성 대사장애, 가벼운 마비증, 식욕부진, 비유량 감소, 사역 후 피로회복, 어린 동물의 허약증, 말의 요통, 칼슘 부족 등을 치료시 보조처방나. 만성 질병 및 만성 대사장애, 어린 동물의 발육부진과 성장촉진, 허약증, 영양 결핍증, 부적절한 사료 급여에 의한 대사장애, 불임증, 기생충 감염에 따른 2차적 빈혈증
- 다. 건강한 동물의 활력 증진 및 저항력 증진

### 용법 및 용량

다음 용량을 정맥, 근육 또는 피하 주사합니다. 만성 질병 및 건강한 동물의 경우 1/2 용량으로 1~2주 간격으로 반복 투여합니다.

가. 소/말	5.0~25.0mL
나. 송아지, 망아지	5.0~12.0mL
다. 포유자돈	1.0~2.5mL
라. 면양, 산양	2.5~5.0mL
마. 어린 양	1.5~2.5mL
바. 개(체중에 따라)	0.5~5.0mL
사. 고양이	0.5~2.5mL

### 주의사항

- \* 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- \* 정맥주사를 할 경우 급하게 주사하는 경우에는 호흡곤란, 오심, 억압증상이 나타날 수 있으므로 서서히 주입하십시오.
- \* 피부나 눈에 접촉시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

### 저장방법/유효(사용)기간

- \* 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

