

칼폰-포르테 (Calphon-forte inj)



칼폰-포르테는 가축에 적용시, 분만 전/후 발생할 수 있는 칼슘 결핍 및 대사장애와 관련된 여러 가지 질환들을 효과적으로 예방하거나 치료할 수 있습니다.

1) 50%의 고농도 칼슘염 용액입니다.

적은 양의 주사로 충분한 칼슘을 공급하여 유열, 분만전후 및 비유중의 각종 마비에 효과적입니다.

2) 카토살 성분이 함유되어 있습니다.

칼폰-포르테는 칼슘 외에도 부타포스판(카토살 성분)이 체내 대사를 촉진합니다.

3) 저칼슘혈증 치료에 효과적입니다.

칼폰-포르테는 특히 모우와 모돈의 저칼슘혈증 치료에도 적합한 제제입니다.

성분 및 함량

제품 1mL중	
Calcium gluconate hydrate	450mg
Calcium glucoheptonate	45mg
Calcium saccharate	10mg
Boric acid	87.5mg
Butaphosphan	8mg

포장단위

100mL

효능 및 효과

- 가. 분만 전후 및 비유중의 저칼슘 혈중에 의한 마비
- 나. 임신 및 비유중의 강직, 수송강직, 목초강직(Tetani) 등
- 다. 소, 면양, 산양에서 임신 말기의 영양장애로 인한 마비증
- 라. 알레르기 중독 및 신경증: 산욕기 혈색소뇨증, 암태지 및 포유중 빈축의 경련, 자반경련, 두드러기, 혈청병, 과민증, 쇠파리에 의한 과민증, 발진말의 파행증, 사료 또는 약물 중독에 의한 피부염 등
- 마. 칼슘 대사장애: 구루병, 골연화증, 갓난 동물의 허약증 및 아세톤뇨증
- 바. 전신적인 대사장애
- 사. 기타 질병: 기관지염, 말의 근색소뇨증, 낚 중독시 간장손상 방지, 약물중독

용법 및 용량

다음 용량을 기준으로 피하, 근육 또는 정맥 주사합니다.

가. 말, 소(체중 500kg 당)	90~125mL
나. 돼지, 면양, 산양, 망아지, 송아지 (체중 50~100kg 당)	20~30mL
다. 포유중의 자돈	2~3mL

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 투약 도중 맥박이 빨라지거나 불규칙할 경우에는 투약을 곧바로 중지하고 심장 기능이 정상으로 회복된 다음 투약을 계속하십시오.
- * 본제를 주사하기 전에 체온 정도로 데운 다음 정맥내로 매우 천천히 주사하거나 근육 내 또는 피하로 주사하십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 36개월

