

흡수 및 이용률을 향상시킨 펠렛형 인산칼슘제

비타-린칼 과립 (Vita-Rinkal pellet)



성분 및 함량
본제 1kg중
제3인산 칼슘

비타민 A 224g
비타민 D₃ 150,000IU
30,000IU
염화나트륨 30g
프로피온산 칼슘 1g

포장단위
20kg

비타-린칼 과립은 성장에 필수적인 성분인 인과 칼슘이 강화된 제품으로 임신/비유중인 소에서 필요한 다량의 인과 칼슘이 함유되어 있습니다.

- 1) **성장 및 건강유지를 위해 필요한 영양소를 가지고 있습니다.**
칼슘, 인뿐만 아니라 비타민 A, D3 등이 함유되어 이용률이 더욱 뛰어납니다. 칼슘과 인의 함량 비율이 1.7:1로 가축의 요구량 비율에 가깝습니다.
- 2) **흡수 및 이용률을 높이기 위해 펠렛으로 만들었습니다.**

■ 효능 및 효과

가. 소 : 인, 칼슘 및 비타민 A, D3 결핍에 의한 구루병, 골연증, 케토시스, 후산정체, 유열의 예방과 치료, 비타민 A/D3/미량광물질(P, Ca 등) 결핍의 예방, 유질 및 유량개선, 성장촉진 및 항병력 강화

나. 돼지 : 인/칼슘/비타민 A 공급, D3 결핍에 의한 골연증, 후구마비, 번식장애의 예방 및 치료, 성장촉진 및 사료효율개선

다. 닭 : 난각질 강화, 연란 및 파란 방지, 산란 성적 개선, 인/칼슘/비타민 A 공급, 비타민 D3 결핍에 의한 골연화증의 예방 및 치료

■ 용법 및 용량

가. 소 : 1일 1두당 다음 용량을 사료에 균등하게 혼합하여 급여합니다.

송아지	50~60g
육성우/성우	60~140g
착유우	120~220g

※송아지는 14일 이상 연속 급여하지 마십시오.
※착유우는 1일 유량 18kg 이상인 경우 유량 1kg 증가당 본제 10g 증량 급여합니다.

나. 돼지 : 1일 1두당 다음 용량을 사료에 균등하게 혼합하여 급여합니다.

육성/비육돈	20~40g
임신돈	40~60g
수유모돈	60~90g

다. 양계 : 사료톤당 4kg을 균등하게 혼합하여 투여합니다.

■ 주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 분만 전 2주 동안에는 임신우에게 투여하지 마십시오.
- * 송아지의 경우 14일 이상 연속 투여하지 마십시오.

■ 저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)의 건조한 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

