

럼푼 (Rompun inj)

처방대상 동물용의약품



성분 및 함량

본제 1mL중
Xylazine hydrochloride
23.32mg

포장단위

10mL

럼푼은 동물의 외과적 수술 및 처치시 진통/진정/마취/근육이완을 목적으로 사용되는 호르몬제입니다.

1) 효과가 빠르고 강력합니다.

럼푼을 정맥 주사시 대개 3~5분 이내, 근육 내 주사시 10~15분 이내에 효과가 나타납니다.

2) 소에 우수한 효과를 가집니다.

럼푼은 소의 통각상실에 효과적으로 작용합니다.

3) 럼푼은 자연적인 수면상태가 유지되며 통증감각이 소실되고 근육이 이완됩니다.

■ 효능 및 효과

소, 말, 개, 고양이와 대/소 외과적 수술 및 처치 시 진정, 진통, 마취, 근육 이완

■ 용법 및 용량

가. 소: 아래 용량을 근육내로 주사합니다.

용량수준	체중 50kg당 용량	체중 100kg당 용량	체중 500kg당 용량
안정목적 또는 수술시	0.12mL	0.25mL	1.2mL
국소외상 수술시	0.25mL	0.5mL	2.5mL
국부절제 수술시	0.5mL	1.0mL	5.0mL
대수술시	0.75mL	1.5mL	7.5mL

나. 말: 체중 100kg당 4mL를 정맥내로 주사합니다.

- 진단을 위한 검사, 외상, 분만장애 등의 처치를 위한 용량입니다.

다. 고양이: 체중 kg당 0.15mL를 근육내로 주사합니다.

- 치아 스케일링, X선촬영, 임상검사, 상처의 드레싱 등을 위한 용량입니다.

라. 개: 체중 10kg당 1.5mL를 근육내로 주사합니다.

- 심한 통증을 수반하지 않는 상태의 처치를 위한 용량입니다.

■ 주의사항

* 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어후 후 사용하십시오.

* 마취된 동물은 부드러운 바닥에 놓아두거나 고정시켜 주십시오.

* 패혈증, 심한 빈혈, 심장이나 폐의 기능장애가 있는 동물은 특히 조심하여 사용하십시오.

* 침이나 음식물이 기관 내로 넘어가는 것을 방지하기 위해 머리와 목을 낮추어 주어야 합니다.

* 마취상태가 오래 계속될 경우에는 직사광선이나 냉기로부터 동물을 보호해 주어야 합니다.

* 실수로 과량을 투여하여 진정상태가 깊게 되거나 호흡장애가 나타날 때에는 인공호흡을 시켜주는 동시에 중추신경흥분제(4-aminopyridine)나 호흡촉진제(Doxapram) 또는 α2 antagonist(Tolazolidone, Yohimbine)를 주사하여 주십시오.

* 소, 말에서 사용시 주의사항

- 높은 용량을 사용할 때는 사용 전에 24시간 절식시켜야 합니다.

- 누워있는 동안 고창증 발생 가능성이 있으므로 우흉횡와(right sternalrecumbency) 자세로 하십시오.

- 조산을 방지하기 위해 임신 말기에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.



- * 개, 고양이에서 사용시 주의사항
 - 본제의 투여로 인하여 구토가 일어나는 경우가 있으므로 식도폐쇄, 위염전, 탈장시에는 사용하지 않아야 합니다.
 - 호흡기 장애가 있을 경우에는 주의하여야 합니다.
 - 구토를 방지하기 위하여 수술전(~24시간)에 절식을 시키는 것이 좋습니다.

사용자 주의사항

- * 자일라진은 안정, 마취, 근육 이완의 성질을 가진 알파-2 아드레날린 작용제로써, 약물이 체내에 흡수되면 용량-의존적 호흡위축, 서맥, 저혈압, 구강 건조, 고혈당 등의 증상이 나타날 수 있으며, 심실 부정맥(Ventricular Arrhythmia)이 보고된 적이 있습니다.
- * 본 제제는 절대로 자가 주사하거나 경구 섭취해서는 안되며, 또한 피부나 눈, 기타 점막에 접촉되지 않도록 각별히 주의해야 합니다.
- * 사고나 부주의로 인해 눈 또는 피부에 접촉될 경우 접촉 부위를 깨끗한 물로 충분히 행구어 내시기 바라며, 만일 이상 증상을 느낄 경우 즉시 제품 설명서를 지참하여 의사의 진찰을 받으시기 바랍니다.
- * 사고나 부주의로 인해 경구 섭취 하거나 주사기에 찔린 경우 즉시 제품 설명서를 지참하여 의사의 진찰을 받으시기 바라며, 병원 이동시 절대로 운전을 해서는 안 됩니다.
- * 임신부의 경우 자궁 수축이나 태아의 혈압 감소 등이 나타날 수 있으므로, 취급 시 주사 바늘에 찔리거나 경구 섭취하지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)의 건조한 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월