

노빈-50 (Novin-50 inj)



성분 및 함량
본제 1mL중
Methampyrone

500mg

포장단위
50mL

노빈-50은 해열, 진통, 진경작용이 우수합니다. 동물의 열성, 동통성 질환에 대증치료 및 보조치료제로 적합한 제제입니다.

1) 해열, 진통, 진경제에 대해 효과적입니다.

해열, 진통, 진경작용이 우수한 피라졸론계 유도체인 메탐피론이 주성분입니다. 메탐피론은 Antipyrene의 약 3배 정도의 강력한 해열, 진통 효과를 가지고 있어 동물의 열성, 동통성 질환에 대증치료 및 보조치료제로 적합한 제제입니다.

2) 모든 동물에 작용합니다.

소, 말, 돼지, 양 등 축산동물뿐만 아니라 소동물인 개, 고양이에도 효과를 발휘합니다.

■ 효능 및 효과

모든 동물의 열성, 동통성 질환의 진경, 진통, 해열작용

■ 용법 및 용량

아래 용량을 1일 1~2회 근육 또는 피하 주사합니다.

가. 대동물 (소, 말): 5~20mL

나. 중동물 (돼지, 양): 5~10mL

다. 소동물 (개, 고양이): 0.5~2mL (체중 kg당 0.44mL)

■ 주의사항

* 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

* 본 약제에 대한 쇼크가 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.

■ 저장방법/유효(사용)기간

* 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.

* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

