

## 마소텐 (Masoten)



**성분 및 함량**

본제 1kg중  
트리클로르폰(Trichlorfon)  
800g

**포장단위**

500g

마소텐은 수산관련 교재에도 제품명으로 명시된 어류의 외부기생충 전문구제제입니다.

- 1) 어류의 물이, 닳벌레, 아가미/피부흡충 등의 외부기생충 구제에 효과적입니다.
- 2) 기생충으로 말미암은 어류의 폐사율을 감소시킵니다.

**효능 및 효과**

물고기의 외부기생충 및 이, 벼룩 등 구제

**용법 및 용량**

가. 연못에서의 치료

잉어	Argulus(물이)와 Lerne(닳벌레)	2,000~4,000L 물에 본제 1g
뱀장어	Dactylogyrus, Gyrodactylus와 Leaches(아가미/피부 흡충)	1,500~3,000L 물에 본제 1g
	Trichodina	400L 물에 본제 1g
잉어	Trichodina를 제외한 모든 외부 기생충	4,000L 물에 본제 1g

나. 단기간 탱크수조에서의 치료

잉어	Argulus, Dactylogyrus 및 Gyrodactylus	1L 물에 본제 25~30g
----	--------------------------------------	-----------------

위의 용량을 연못이나 일시 치료를 위한 탱크 수조에 미리 물에 타서 뿌리거나 가루를 뿌립니다. 약국은 5~10분 이내로 실시합니다. 필요하면 2~3주 후 다시 반복합니다.

**주의사항**

- \* 양어 전용이므로 타 축종에 대해서는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- \* 본제는 온혈동물에 대해 독성이 극히 낮으나 사용 시 취급자는 약제가 피부, 식기, 음식물 등에 닿지 않도록 주의하고 취급 후 손, 노출된 피부, 얼굴을 물과 비누로 완전히 씻어내시고 젖은 옷은 즉시 벗으십시오.
- \* 어류의 기생충 구제에 있어서 못, 수온, 수질, 어류의 대소, 사료와 어류의 영양 상태 등 각종의 조건에 의해 약제의 효과와 독성에 차이가 있으므로 이상의 조건이 급변하든가, 급변이 예상되는 경우에는 사용을 피해주십시오.
- \* 문어, 새우, 조개류는 본제에 극히 저항성이 없으니 이런 류를 양식하는 곳에서 는 사용하지 마십시오.
- \* 정해진 용법/용량을 준수하지 않을 경우 오/남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.

**저장방법/유효(사용)기간**

- \* 직사광선을 피해 서늘하고 시원한 곳에 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

