

애완용 동물용의약품



프로펜더[®] 캣

■허가번호 제21-43호

■원료약품 및 분량(본제 1mL중)

프라지퀀텔(Praziquantel, EP)	85,75mg
에모덱시드(Emodepside, 별규)	21,43mg
이소프로필리덴 글리세롤(1,2-isopropylidene glycerol, 별규)	945,82mg
락트산(Lactic acid, EP)	21,60mg
부틸히드록시시아니솔(Butylhydroxyanisole, EP)	5,40mg

■효능 및 효과

대상동물	효능·효과	적응증
고양이	복합기생충 감염증의 치료	회충 고양이회충 <i>Toxocara cati</i> 사자회충 <i>Toxascaris leonina</i>
		구충 십이지장충 <i>Ancylostoma tubaeforme</i> 촌충 개조충 <i>Dipylidium caninum</i> 고양이조충 <i>Taenia taeniaeformis</i> 다방조충 <i>Echinococcus multilocularis</i>

■용법 및 용량

가. 권장 용량은 체중 kg당 3mg의 에모덱시드와 12mg의 프라지퀀텔이며 이는 본제 0,14mL에 해당합니다.
나. 피펫 투경의 뾰족한 부분으로 피펫 끝을 구멍내어 사용하십시오.
다. 고양이의 체중에 맞는 제품을 투여하십시오.
라. 피부가 보일 때까지 목 부위의 털을 헤치고 피펫을 짜내어 도포하십시오.
마. 1회 투여로 구충효과가 충분합니다.

체중별(kg)	용량(mL)
0,5 - 2,5	0,35
2,5 - 5,0	0,70
5,0 - 8,0	1,12
8,0 이상	적절한 크기의 피펫을 조합하여 사용하십시오

■제조원

Bayer Animal Health GmbH
(KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH)
Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Germany

■구입문의 (주)벨벳 02-478-1440

■수입/판매원

바이엘코리아(주)

본사: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23
공장/창고: 경기도 안산시 단원구 능안로 14
무로상담전화: 080-500-5998

프로펜더[®] 캣은 동물병원에서 구입하실 수 있습니다.

Made in Germany

바이엘 Bayer

뒷면에
설명서 계속됩니다.



■사용상의 주의사항

- 가. 경고
- 1) 피부에만 사용하고 절대로 경구나 주사로 투여하지 마십시오.
 - 2) 투약 직후 고양이를 목욕시키면 제품의 효능을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 투약한 동물은 도포부위가 마를때까지 목욕을 삼가하십시오.
 - 3) 같은 계열의 구충제를 빈번하게 사용할 경우 내성이 증가될 가능성이 있으므로 수의사와 상의하여 사용하십시오.
- 나. 금기사항
- 1) 8주령 미만의 고양이나 0,5kg 미만의 고양이에 사용하지 마십시오.
- 다. 투여시 부작용 우려사항
- 1) 약제를 삼켰을 경우에는 설명서를 가지고 의사의 진찰을 받으십시오.
 - 2) 피부나 눈에 약제가 묻어 이상반응이 지속될 경우 제품포장지와 설명서를 가지고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 라. 부작용
- 1) 고양이가 도포 부위를 핥으면 매우 드물게 침을 흘리거나 구토를 할 수도 있습니다.
 - 2) 고양이가 도포 부위를 핥으면 매우 드물게 운동실조나 불안감 같은 미약하고 일시적인 신경증상을 일으킬 수 있습니다.
 - 3) 매우 드물게 일시적인 탈모, 소양증, 염증이 도포 부위에 일어날 수 있습니다.
- 마. 일반적 주의사항
- 1) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
 - 2) 사용전 설명서를 참고하십시오.
 - 3) 가족, 섬유, 플라스틱등의 물질은 본제의 용매에 영향을 받을 수 있으므로 도포 부위의 약제가 마르기 전에 접촉을 삼가하십시오.
 - 4) 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
 - 5) 어린이들이 약제가 도포된 지 24시간이 채 지나지 않은 고양이를 지속적으로 접촉하지 않도록 주의하십시오.

- 6) 제품 투약시에는 음료를 마시거나 흡연, 음식물 섭취를 삼가하십시오.
- 바. 임신, 수유, 신생, 어린동물, 쇠약동물 등에 대한 투여
- 1) 임신과 수유기에도 사용할 수 있습니다.
 - 2) 아프거나 쇠약한 고양이에서는 제품 투여의 득실을 고려하여 사용 여부를 결정하십시오. 필요시 수의사에게 문의하십시오.
- 사. 적용상의 주의
- 1) 피부에 약제가 묻었을 경우에는 즉시 비누와 물로 씻으십시오.
 - 2) 눈에 약제가 들어갔을 경우 물로 여러번 씻어 내십시오.
 - 3) 투약한 고양이의 도포 부위가 마를 때까지 다른 고양이들이 핥지 않도록 주의하십시오.
- 아. 기타
- 1) 수중생물에 위험을 줄 수 있으므로 남은 약제는 주의하여 폐기하십시오.
 - 2) 사용후 손을 깨끗이 씻으십시오.
 - 3) 피부에 도포하는 특성상 과량 투여 및 오남용으로 인한 공중위생상의 문제가 일어나지 않도록 주의하십시오.
- 저장방법
- 습기를 피하여 실온(1~30℃)에 보관할 것
- 유효기간
- 제조일로부터 36개월
(사용기한 보는 법: 표시된 월의 1일까지)