

# 바이믹스 티아몰린-39 (Baymix Tiamulin-39)



바이믹스 티아몰린-39는 돈적리와 회장염의 치료에 뛰어난 효과를 보이는 사료첨가용 항생제로 주원료를 코팅하여 자극적인 냄새를 줄이고 제품의 흡수율을 높인 차세대 티아몰린 첨가제입니다.

### 1) 돈적리와 회장염에 뛰어난 효과

바이믹스 티아몰린-39는 육성기에 다발하는 돈적리와 회장염에 높은 감수성을 가지고 있습니다.

### 2) 검증된 품질

바이믹스 티아몰린-39는 유럽 GMP 기준으로 생산한 99% 이상의 고순도의 티아몰린 원료를 사용함으로써 주원료의 기대효과를 정확히 반영할 수 있습니다.

### 3) 높은 기호성과 흡수율을 통한 온전한 약효 구현

바이믹스 티아몰린-39는 코팅 기법을 통해 티아몰린 본유의 자극적인 냄새와 상부소화기계의 약효 소실을 최소화하여 주원료의 약효가 온전히 구현될 수 있습니다.

#### 성분 및 함량

본제 1kg중  
티아몰린 하이드로젠 푸마레이트 과립 (Tiamulin hydrogen fumarate granule) 48,750g  
(Tiamulin hydrogen fumarate 로서 39,0g)

#### 포장단위

5kg

#### 효능 및 효과

- 가. 돼지의 돈적리 등 세균성 설사증의 치료
- 나. 돼지의 마이코플라스마 등 세균성 폐렴의 치료
- 다. 돼지의 증식성 회장염 치료

#### 용법 및 용량

##### [일반사료 첨가용]

- 가. 세균성 적리, 마이코플라스마 및 세균성 폐렴, 설사증의 치료  
: 사료톤당 본제 1.54~2,56kg(60~100ppm)을 10일간 투여합니다.
- 나. 돼지의 증식성 회장염 치료  
: 사료톤당 본제 3.75~5kg을 혼합 투여합니다.

#### 주의사항

- \* 제품 사용시 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- \* 사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오
- \* 본 제제는 아이오노포머계 항콕시듐제(모넨신, 나라신, 살리노마이신) 제제와 함께 투여하지 마십시오
- \* 휴약기간: 돼지 5일

#### 저장방법/유효(사용)기간

- \* 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

