

바이트릴® 오틱

■ 허가번호 제21-54호

■ 원료약품 및 분량 (본제 1mL중)

엔로플록사신(Enrofloxacin, 별규) 5g
 설파디아진은(Silver Sulfadiazine, USP) 10g
 벤질알코올(Benzyl Alcohol, USP NF) 적량

■ 효능 및 효과

가. 대상동물 : 개

나. 효능효과 : 엔로플록사신과 설파디아진은에

감수성이 있는 세균(*Staphylococcus*

pseudintermedius, *Pseudomonas aeruginosa*,

Proteus spp)과 진균(*Malassezia pachyderma-*

tis)에 의한 외이염의 치료

■ 용법 및 용량

가. 대상동물 : 개

나. 용법 : 점이투여

다. 용량 및 투약기간

a) 감염된 귀에 1일 2회 7~14일간 적용한다.

b) 체중이 35lb(16kg) 이하인 개 한 마리에 투약
시마다 본제 5~10방울을 점적하며, 35lb(16kg)
이상인 개에서는 10~15방울을 점적한다.

c) 투약 후 귀를 부드럽게 문질러주어 외이도
전체에 약물이 완전하고 고르게 분포할 수
있도록 한다.

■ 주의사항

[다음 환축에 투여하지 말 것]

1) 퀴놀론계열 또는 설파제에 과민한 동물에게는
본제를 투약하지 마십시오.

2) 고막이 천공되었을 경우 사용하지 마십시오.

[일반적 주의사항]

1) 수의사의 지시에 의해 사용하십시오.

2) 동물용의약품이므로 사람에게서 절대 사용하지
마십시오.

[사용방법상의 주의]

1) 사용 전에 충분히 흔들어 사용하십시오.

2) 손상된 측의 귀가 수평이 되도록 머리를 기울인
후 사용하십시오.

3) 눈에 접촉되지 않도록 하되 접촉한 경우 즉시
다량의 물로 15분간 씻어내십시오.

4) 피부에 접촉한 경우, 비누와 물로 피부를
세척하십시오.

5) 눈이나 피부접촉 후 자극반응이 나타나거나
지속되면 의사의 치료를 받으십시오.

6) 사람에서 사용자가 퀴놀론에 과도하게 노출된 후
수 시간 이내에 광감각성이 있을 수 있습니다.
실수로 과도하게 노출된 경우에는 직사광선을
피하십시오.

[저장상의 주의사항]

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[기타]

1) 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

2) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신
경우 수입판매회사로 연락해 주시기 바랍니다.

■ 저장방법 기밀용기, 25℃ 이하의 실온에
보관하십시오.

■ 유효(사용)기간 제조일로부터 36개월

■ 제조원

Bayer HealthCare LLC, Animal Health Division

12707 Shawnee Mission Parkway, Shawnee Mission,

Kansas 66201-0390, USA

■ 수입/판매원

바이엘코리아(주)

본사: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23

공장/창고: 경기도 안산시 단원구 능안로 14

무료상담전화: 080-500-5998

■ 구입문의 (주)포베츠 031-265-4080