

오부프로스트 (Ovuprost inj)

처방대상 동물용의약품



오부프로스트는 합성 프로스타글란딘 주사제로서 성상은 무색의 투명한 액체입니다. 황체 퇴행과 자궁근 수축 및 자궁경관 확장 효과가 있습니다.

- 1) 소에서 오부레린(성선 자극 호르몬)과 함께 사용하여 발정 동기화를 유도하여 보다 우수한 번식력 개선 효과를 기대할 수 있습니다.
- 2) 돼지에서 유도 분만을 위해 사용할 수 있습니다.

■ 효능 및 효과

가. 소

- 발정유도 및 동기화
- 난소기능장애, 황체낭종, 무발정의 치료, 자궁질행(태반정체, 자궁내막염, 자궁축농증 등), 비정상적인 임신의 종식, 분만유도

나. 돼지 : 유도분만

성분 및 함량

본제 1mL중
Cloprostenol 250 μ g

포장단위
20mL

■ 용법 및 용량

가. 소 : 아래의 경우에 1두당 1회 2mL(cloprostenol로서 500 μ g)를 근육 주사합니다.

- 발정주기의 동기화
- 무발정의 치료
- 난소기능장애(정상적인 황체를 보이나 발정이 없는 경우)
- 비정상적인 임신의 종식
- 분만의 유도(일반적인 유도분만이 아닌 경우)

나. 돼지 : 분만 예정일로부터 3일 이내에 0.7mL를 근육 주사합니다.
(투여 후 36~48시간 사이에 분만 시작)

■ 주의사항

- * 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용하십시오.
- * 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 소에서 분만 유도를 목적으로 사용 시 투여 시기에 따라 태반 정체가 나타날 수 있습니다.
- * 돼지 미성숙 자돈의 출산을 막기 위하여 임신 111일 이전의 분만 유도는 시도하지 마십시오.
- * 본제의 주성분은 피부를 통해 쉽게 흡수되고 임신기 여성이나 천식 등 기관지 질환이 있는 사람에서는 유산과 기관지 수축을 유발할 수 있으므로 본제를 취급할 경우에는 각별히 주의하시기 바랍니다.
- * 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- * 휴약기간 : 없음

■ 저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(25 $^{\circ}$ C 이하)에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

