

오부레린 (Ovurelin inj)

처방대상 동물용의약품



오부레린은 합성 성선자극호르몬 방출호르몬 주사제로서, 성상은 무색의 투명한 액체입니다. PGF2 α 제제와 함께 사용하여 소의 발정동기화, 배란지연의 예방, 난소낭종의 치료 효과가 있습니다.

- 1) 소에서 오부프로스트(PGF2 α)와 함께 사용하여 발정 동기화를 유도하여, 보다 우수한 번식력 개선 효과를 기대할 수 있습니다.
- 2) 소에서 배란지연의 예방 및 난소 낭종의 치료를 위해 사용할 수 있습니다.

효능 및 효과

가. 대상동물: 소

나. 발정동기화, 배란지연의 예방, 산후번식력의 개선, 난소낭종의 치료

성분 및 함량

본제 1mL중
Gonadorelin
(GnRH)

100µg

포장당위
20mL

용법 및 용량

가. 소: 발정동기화 프로그램은 아래 절차를 따라 시행합니다.

- 0일: 본제 1mL 근육주사
- 7일: 오부프로스트 2mL 근육주사
- 9일: 본제 1mL 근육주사, 주사 후 8~24시간에 인공수정

나. 배란지연의 예방: 본제 2.5mL 근육주사

다. 산후 번식력 개선: 본제 2.5mL 근육주사

라. 난소 낭종: 본제 5mL 근육주사

주의사항

- * 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용하십시오.
- * 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본제를 사용시에는 반드시 보호장갑을 착용하시고 피부에 접촉한 경우에는 물과 비누로 즉시 씻어낸 후 이상증상을 느끼는 경우 제품 사용설명서를 지참하여 즉시 의사와 상담하십시오.
- * 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확인되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오. 정해진 용법 용량을 준수하십시오.
- * 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- * 휴약기간 : 없음

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(25°C 이하)에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

