

틸맥스 250 (Tilmax 250 OS)

처방대상 동물용의약품



성분 및 함량

본제 1L중
틸미코신 인산염
(Tilmicosin phosphate)
333.3g
(틸미코신 Tilmicosin으로
서 250.0g)

포장단위
1L

틸맥스 250은 닭, 돼지에서 호흡기 질병 치료제입니다.

1) 우수한 효과와 검증된 품질

틸맥스 250은 마이코플라즈마에 대해서 높은 감수성을 지니고 있으며 바 이엘의 엄격한 품질관리를 통해 신뢰할 수 있는 효과를 나타냅니다.

2) 신속한 체내 분포와 오래 지속되는 약효

경구 투여 후 4시간 전후에 최대 혈장 농도에 도달하고 지속적으로 체내에 서 약효를 나타내 마이코플라즈마병의 발현을 막아줍니다.

3) 간편한 투약방법

권장 용량에 따라 음수에 희석하여 손쉽게 투여할 수 있습니다.

효능 및 효과

틸미코신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
가. 돼지

- 파스튜렐라 폐렴(*Pasturella multocida*)
- 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)
- 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*)

나. 닭

- 마이코플라즈마병(*Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*)

용법 및 용량

가. 돼지 : 일일 음수 L당 본제 0.8mL(틸미코신으로서 200mg)을 희석하여 5일간 음수 투여합니다.

나. 닭 : 일일 음수 L당 본제 0.3mL(틸미코신으로서 75mg)을 희석하여 3~5일간 음수 투여합니다.

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 휴약기간 : 닭 10일, 돼지 7일
- * 본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- * Lincosamide계 및 다른 Macrolide계의 항생제와 병용하지 마십시오.
- * 임신중인 돼지와 번식 목적의 돼지에는 사용하지 마십시오.
- * 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.
- * 음수에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적에 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

