

사용하기 편리하고 기호성이 좋은 살서제

라믹 미니바 (Ramik minibars)



성분 및 함량

본제 100g중
디파시논

0.005g

포장단위
4lbs(64개입)

라믹 미니바는 사용이 간편하고, 쥐에 대한 기호성이 높은 미끼 먹이가 혼합된 살서제입니다.

- 1) 곰취, 생쥐가 좋아하는 미끼먹이가 혼합되어 있어 사용이 간편합니다.
- 2) 습도가 높은 환경에서도 사용할 수 있습니다.
- 3) 구서효과가 탁월하여, 농장에서 지속적으로 효과적으로 사용할 수 있습니다.
- 4) 미끼통과 함께 사용하면 섭취량을 확인할 수 있어 정확한 구서 관리가 가능합니다.
- 5) 식약처의 허가를 받은 제품으로 안심하고 사용할 수 있습니다.

효능 및 효과

쥐의 구제(만성 항혈액 응고성 살서제)

용법 및 용량

가. 인체에 직접 사용하지 마십시오.

나. 쥐 : 본제 4~16개(28.5g/1개)를 5~10m 간격으로 쥐가 잘 다니는 곳이나 쥐의 서식처 근처에 설치합니다.

다. 제품을 담은 용기는 애완동물이나 다른 포유동물이 접근할 수 없도록 적당하게 보호될 수 있는 용기를 사용합니다.

라. 쥐의 서식밀도를 고려하여 이 약의 설치장소를 주기적으로 점검하고 필요에 따라 사용량을 증가시키거나, 설치 3~7일 후에도 약제가 없어진 흔적이 없는 경우 다른 곳에 재설치합니다.

마. 살충/살균/구서를 위한 방역소독지침(질병관리본부)에 따라 사용합니다.

주의사항

* 응급조치

1) 피부에 묻었을 때 : 피부 또는 옷에 묻었을 경우 오염된 모든 의복은 벗거나 제거합니다. 피부는 15~20분간 충분한 물로 씻어냅니다. 만약 피부자극 등이 있을 경우에는 의사와 상담합니다.

2) 눈에 묻었을 때 : 눈을 뜨게 한 후 15~20분간 물로 천천히 씻어냅니다. 콘택트렌즈를 착용한 경우, 렌즈를 제거하고 5분 정도 뒤에 계속해서 눈을 헹구어냅니다. 의사의 지시에 따라 처치하십시오.

3) 흡입하였을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취합니다. 호흡기 증상이 나타나면 의사와 상담하십시오.

4) 삼켰을 때 : 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하고 의사의 지시가 있을 때까지 토하게 하지 않습니다. 환자가 삼킬 수 있는 상태라면 물을 마시게 합니다. 무의식 환자의 구강을 통해 어떠한 것도 주어서는 안됩니다.

* 어린이, 애완동물, 가축, 야생동물이 접근하지 못하는 곳에 이 약을 설치하거나 쉽게 접근할 수 없는 바이트 상자 안에 설치합니다.

* 사용하고 남은 약제나 약제부스러기 등을 하천이나 하수구, 도랑 등에 버리거나 땅에 묻지 마십시오.

저장방법/유효(사용)기간

* 실온(1~30℃)의 서늘하고 건조한 곳, 밀폐용기에 보관하십시오.

* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월