

바이멕 프리믹스 (Baymec Premix)



성분 및 함량
본제 1kg중
Ivermectin

6.0g

포장단위
5kg

사용이 편리한 바이멕 프리믹스는 광범위한 내/외부 기생충을 안전하고 신속하게 구제합니다.

- 1) 사료에 섞어 편리하게 적용이 가능합니다.
- 2) 경제적인 비용으로 기생충을 구제합니다.
- 3) 광범위한 내/외부 기생충을 빠르고 효과적으로 제거합니다.
- 4) 돼지에 안전합니다.

바이멕 프리믹스는 무척추 동물(기생충)의 신경 및 근육 세포에 친화성이 높지만 척추동물(돼지)에는 친화성이 낮아 안전성이 높습니다.

효능 및 효과

돼지의 선충류 및 돈폐충, 돈신충, 이, 개선충의 감염 예방 및 치료

용법 및 용량

구충시 본제를 다음의 용량으로 사료에 균등히 혼합하여 7일간 연속 경구 투여합니다.

구분	체중범위	사료섭취량	투여용량	
			사료톤당 혼합량	비고(Ivermectin, 역가)
자돈	40kg	50g/kg 체중	335g	2ppm
육성돈	40~100kg	42g/kg 체중	400g	2.4ppm
모돈	200kg	2~3kg/일	1.115~1.670kg	6.7~10ppm
웅돈	250kg	2.5~3kg/일	1.380~1.670kg	8.3~10ppm

주의사항

- * 분만 28일 이전에는 투약하지 마십시오.
- * 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- * 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 오남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법, 용량을 준수하십시오.
- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- * 사료에 혼합시 고르게 혼합하여 사용하십시오.
- * 휴약기간: 돼지 도축전 28일

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30°C)에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

