

농장에 이득이 되는 편리한 습관

# 바이코кс 아이언 (Baycox Iron oral suspension)



**성분 및 함량**  
 본제 1L중  
 Toltrazuril  
 50g  
 Iron Dextran  
 608g  
 (Iron으로 228g)  
**포장단위**  
 100mL

바이코кс 아이언은 *Isospora suis*로 인한 콕시듐증과 철분결핍성 빈혈을 예방하는 세계 최초로 개발된 톨트라주릴과 아이언 덱스트란의 경구용 합제입니다.

- 1) 세계 최초로 개발된 경구용 합제입니다.  
한 번의 경구 투여로 콕시듐증과 철분결핍성 빈혈을 예방합니다.
- 2) 손쉬운 사용으로 관리시간과 작업비용을 절약합니다.
- 3) 포유자돈과 작업관리자 모두의 스트레스를 줄여줍니다.
- 4) 주사 횟수의 감소로 동물복지가 증진됩니다.
- 5) 검증된 원료로 독일에서 제조하여 국내에서 소분 포장한 제품입니다.  
검증된 톨트라주릴(바이엘 오리지널)과 아이언 덱스트란을 사용하여 독일 바이엘에서만 제조 가능한 제품입니다.

**6) 전용 투약기로 손쉽게 투약이 가능합니다.**  
 바이코кс 아이언용 전용투약기로 정확한 양을 손쉽게 투약할 수 있습니다.

**7) 과학적인 검증자료**  
 기존 관리 방법(바이코кс5%+철분주사)과 비교하여 동일한 적용 효과를 나타내었고, 관련 내용은 논문으로 발표되었습니다.

### ■ 효능 및 효과

- 가. 대상동물 : 자돈
- 나. *Isospora suis*에 의한 콕시듐증의 기왕력이 있는 농장의 신생 자돈에서 콕시듐증의 임상증상의 예방과 철분 공급

### ■ 용법 및 용량

- 가. 개체마다 투약하십시오.
- 나. 3일령 자돈 1두당 1.0mL의 양을 1회 경구로 투여합니다.

### ■ 주의사항

- \* 휴약기간 : 자돈 67일
- \* 안전성 및 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 약제와 함께 희석하여 사용하지 마시오.
- \* 정해진 용법/용량을 준수하십시오.
- \* 사용 전에 충분히 흔들어 주십시오.

### ■ 저장방법/유효(사용)기간

- \* 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)의 건조한 곳에 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

