

# 팜플루이드-에스 (FarmFluid-S)



### 성분 및 함량

본제 1L중  
 고온건류 타르산(High Boiling Tar Acids) 420.5g  
 크레솔(Cresol) 52.5g  
 도데실 벤젠 설펜산 (Dodecyl Benzene Sulphonic Acid) 252.5g  
 아세트산 80%(Acetic Acid 80%) 327.7g  
 (Acetic Acid로서 262.1g)

포장단위  
 5L, 18L

팜플루이드-에스는 오염된 돈사의 소독에 효과적인 양돈 전용 소독제입니다.

1) 모든 병원성 미생물을 빠른 시간내에 완전히 살멸합니다.

양돈장에서 문제되는 세균뿐만 아니라 각종 질병의 1차적 원인으로 작용하는 바이러스에 대한 효능이 우수한 소독제입니다.

2) 경제적입니다.

일반 소독시 400배, 각종 질병 발생시나 발생 위험시에도 유효살멸 희석 배수가 높으므로 경제적입니다.

3) 양돈장에서 사용하기에 적합한 소독제입니다.

### 효능 및 효과

가. 살 바이러스 효과 : 돼지열병(Classic swine fever virus), 돼지생식기호흡기증후군(PRRS virus), 구제역(FMD virus)

나. 살균 효과 : 일반세균(*Salmonella typhimurium*), 아포세균(*Clostridium perfringens*)

다. 오염된 축사의 소독 효과

### 용법 및 용량

소독 대상	대상질병명	권장희석배수						
		시험	경수조건	일반세균	특정 대상질병			
					아포세균	돼지열병	PRRS	
	결과	유기물조건	1:3,200	1:120,000	1:6,400	1:3,200		
			1:500	1:24,000	1:1,000	1:1,000		
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 축사기구, 일반 차량의 운전석 내부, 도로 등	일반세균(경) + 특정세균(경)	3,200배	120,000배	6,400배	3,200배		
유기물이 많은 소독대상	소독조(발판), 출입구, 축사바닥, 운동장, 발생생지주변, 발생지 농장 출입차량 내외부 등, 운반기구(농장용, 운송, 분노, 시료, 건조, 우유 차량 내외부 등)	일반세균(유) + 특정세균(유)	500배	24,000배	1,000배	1,000배	500배	

※ 단, 일반세균과 특정세균, 특정 바이러스를 동시에 소독할 경우, 경수(유기물이 적은 소독대상)와 유기물(유기물이 많은 소독대상)에서의 시험결과를 비교하여 높은 소독제 농도(낮은 희석배수)의 사용을 권장합니다.



## 팜플루이드-에스 (FarmFluid-S)

### 주의사항

- \* 취급 시 장갑, 마스크, 보호 안경, 보호의 등 보호 장구를 착용하고 취급 후 사용자는 몸을 깨끗이 씻으십시오.
- \* 원액을 별도의 용기에 따라 경우 미리 용기에 적당량의 물을 채워 놓은 후 소독액을 따르는 것이 안전하며, 따르는 과정 중에 원액이 튀지 않도록 주의하여 따르십시오.
- \* 가축에 직접 살포하지 마십시오.
- \* 본제는 일반 금속이나 차량 금속 등에 부식성이 있을 수 있어 사용 후 얼룩이 남을 수 있으므로 소독후에는 깨끗한 물로 세척하십시오.
- \* 약효 및 안전상에 문제가 발생할 수 있으므로 다른 약품과는 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
- \* 유기 물질(분뇨, 오물, 사료 찌꺼기 등)이 있는 경우 소독 효과가 떨어질 수 있으니 먼저 유기 물질을 제거하고 난 후에 소독하십시오.
- \* 사용시 원액이나 희석액이 눈이나 피부 등에 접촉되거나, 마시거나, 증기를 흡입하지 않도록 주의하고, 만일 접촉되거나 흡입 또는 마셨을 경우에는 다음의 절차를 따르십시오.
  - 1) 눈에 들어간 경우 : 최소 15분 이상 충분한 양의 물로 눈을 행귀낸 후 즉시 가까운 의료 기관을 방문하여 진료를 받으십시오. 눈을 씻을 경우 눈을 손으로 비비지 말고 흐르는 물에 눈을 행귀 주십시오. 눈에 접촉 후 별다른 이상을 느끼지 못할 경우라도 할지라도 반드시 의료 기관의 검진을 받으십시오.
  - 2) 피부에 묻은 경우 : 즉시 깨끗한 물로 씻어낸 후 피부 자극과 같은 이상 증상을 느낄 경우 가까운 의료 기관을 방문하여 검진을 받으십시오.
  - 3) 원액의 증기를 다량 흡입한 경우 : 어지러움, 호흡 곤란 등의 이상 증상을 느낄 경우 즉시 의료 기관을 방문하여 검진을 받으십시오.
  - 4) 마신 경우 : 강제로 토하려고 시도해서는 안 되며, 즉시 충분한 양의 물이나 우유를 마신 후 의료 기관을 방문하여 검진을 받으십시오.
  - 5) 의류 등에 묻은 경우 : 즉시 의류를 모두 벗은 후 몸을 씻어내고 새로운 의류로 갈아입으십시오. 만일 신체에 이상을 느낄 경우에는 즉시 의료기관을 방문하여 검진을 받으십시오.

### 저장방법/유효(사용)기간

- \* 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)에 세워서 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 36개월