

# 비판텐® 연고

(덱스판테놀)

일반의약품

분류번호 269 (기타의 외피용약)

## [원료약품 및 그 분량]

이 약 1g 중 덱스판테놀(EP) 50mg 함유

첨가제: 세탄올, 스테아릴알코올, 백납, 정제라놀린, 파라핀소프트납, 정제아몬드유, 유동파라핀, 프로테진엑스, 정제수

**[성상]** 라놀린 냄새가 나는 미황색의 불투명한 연고제

## [효능·효과]

상처, 화상, 찢긴 상처(수유기 중의 유두균열(갈라짐) 등), 욕창, 급·만성 피부염, 습진, 피부궤양, 기저귀발진, 햇볕에 탄 데(일광피부염)의 보조치료

## [용법·용량]

- 1) 상처를 청결히 한 후 환부에 1일 1-2회 바른다.
- 2) 수유기 중의 유두균열에는 매 수유 직후 유두에 바른다.

## [사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 1) 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
  - 2) 감염성 또는 삼출성 피부병 환자
2. 부작용  
드물게 알레르기 피부 반응이 나타날 수 있다.
3. 상호작용  
덱스판테놀을 근육주사하는 경우
  - 1) 덱스판테놀의 큐라레 길항작용에 의해 큐라레양 근육이완제의 효과가 감소된다.
  - 2) 염화석시닐콜린의 신경근 차단작용이 증강된다.

**[저장방법]** 기밀용기, 25°C이하 보관

**[포장단위]** 30g/튜브

**[개정년월일]** 2017.12.01