

신중하고 월등하게!

## 바이트릴 50주 (Baytril 50inj)

처방대상 동물용의약품



성분 및 함량  
본체 1mL중  
Enrofloxacin

50mg

포장단위  
50mL, 100mL

바이트릴 50주는 설사와 호흡기 질환을 유발하는 다양한 세균에 대해 강력하고 빠르게 작용하는 광범위 농도의존성 살균제입니다.

### 1) 넓은 항균범위와 뛰어난 항균효과

바이트릴 50주는 살모넬라증, 대장균증과 같은 설사와 마이코플라즈마성 폐렴, 흉막폐렴, 파스튜렐라 폐렴과 같은 주요 호흡기 질환을 유발하는 다양한 세균에 대해 높은 감수성을 나타내는 광범위 항균제입니다.

### 2) 신속한 치료효과와 강력한 내성세균 억제작용

바이트릴 50주는 투여 후 1시간 이내에 감염 부위로 빠르게 흡수되어 신속한 살균 효과를 나타내며, 내성변이주 억제농도(MPC)보다 높은 농도로 분포함으로써 내성세균의 선택적 증가를 효과적으로 방지하는 농도의존성 살균제입니다.

### 3) 높은 안전성과 짧은 휴약기간

오리지널 엔로플록사신 원료를 사용하여 유사제품보다 휴약기간이 10일 이상 짧기 때문에 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.

### ■ 효능 및 효과

- 가. 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료  
나. 돼지 : 살모넬라증(*Salmonella spp.*), 대장균증(설사증, 장독혈증, *E. coli*), 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella spp.*), 기관지 폐렴(*Bordetella spp.*)  
다. 송아지 : 대장균증(*E. coli*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*), 마이코플라즈마증(*Mycoplasma bovis*)

### ■ 용법 및 용량

돼지 : 근육주사, 송아지 : 피하주사

대상축종	일반 세균성질병	중증의 호흡기/ 소화기질병	살모넬라증
돼지, 송아지	1일 체중 10kg당 0.5mL를 3일 투여	1일 체중 10kg당 1mL를 3~5일 투여	1일 체중 10kg당 1mL를 5일 투여

### ■ 주의사항

- \* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.  
\* 휴약기간 : 돼지 10일, 소 14일(우유 : 4일)

### ■ 저장방법/유효(사용)기간

- \* 실온(1~30°C)의 어두운 곳에 보관하십시오.  
\* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

