

빠르고 쉽게!

바이트릴 맥스 (Baytril Max)

처방대상 동물용의약품



성분 및 함량
본제 1mL중
Enrofloxacin

100mg

포장단위
100mL

바이트릴 맥스는 엔로플록사신을 BayK9 공법으로 제조한 새로운 살균제로, 혈중 및 조직 내에 높은 농도로 분포되어 세균 감염증에 대해 강력하고 빠르게 작용하는 원상 치료제입니다.

1) 신속하고 강력한 항균효과

바이트릴 맥스는 주요 호흡기 감염세균에 대해 뛰어난 감수성을 나타내며, 투여 후 30분 이내 빠르게 흡수되고 표적 장기와 백혈구에 높은 농도로 분포됨으로써 감염 세균을 신속하고 강력하게 사멸합니다.

2) 뛰어난 내성세균 억제 작용

내성변이주 억제농도(MPC) 이상으로 치료농도가 장기간 유지됨으로써 내성 세균의 선택적 증가를 효과적으로 방지하는 뛰어난 항균제입니다.

3) 간편한 원상 치료

72시간 동안 약효를 유지하므로 1회 주사로 간편하게 치료할 수 있습니다.

■ 효능 및 효과

가. 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 호흡기 질환의 치료

나. 돼지 : 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 글래서병(*Haemophilus parasuis*), 연쇄상구균증(*Streptococcus suis*), 기관지 폐렴(*Bordetella bronchiseptica*)

다. 소 : 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*), 헤모필루스 감염증(*Haemophilus somnus*), 마이코플라스마증(*Mycoplasma spp.*)

■ 용법 및 용량

대상축종	용법		용량			
돼지	근육주사, 피하주사		20kg당 1.5mL를 1회에 한하여 주사(7.5mg/kgBW)			
소	피하주사		100kg당 7.5mL를 1회에 한하여 주사(7.5mg/kgBW)			
체중(kg)	13.3	20	40	60	80	100
투여용량(mL)	1	1.5	3	4.5	6	7.5

■ 주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 휴약기간은 다음과 같습니다.

- 돼지 : 피하/근육주사시 14일

- 소 : 피하주사(식육 14일/우유 3일)

* 젖소는 마지막 치료 후 72시간이 지난 다음 항생제 잔류검사를 실시하여 우유 내 잔류 여부를 확인한 다음 납유하십시오.

* 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축산물 내에 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.

■ 저장방법/유효(사용)기간

* 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.

* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 36개월

