

타도마이오셀콤프 III (Tardomyocelcomp III inj)

처방대상 동물용의약품



타도마이오셀콤프 III는 각종 세균성 질병에 대한 치료제로서 2종의 페니실린과 스트렙토마이신이 상승 작용하여 감염 세균에 효과적으로 제거하며 유효혈중농도가 3일(72시간) 이상 오래 유지됩니다.

1) 오랫동안 유지되는 유효혈중농도
권장용량에 따라 주사하면 3일간 유효혈중농도가 유지됩니다.

2) 편리한 원샷 투여
지속성이 높아 매일 주사하는 번거로움이 없고, 체중 kg당 투여량이 적어 모든에 적용하기 쉽습니다.

3) 급성·만성 감염증에 모두 우수한 효과
농과 기타 단백질이 많이 분포하는 염증 상황에서도 우수한 항균 효과를 나타내므로 세균에 의한 급성/만성 감염증에 모두 효과를 나타냅니다.

성분 및 함량

- 본제 1mL중
- 페니실린G벤자틴 (Benzathine Penicillin G) 100,000IU
- 페니실린G프로카인 (Procaine Penicillin G) 25,000IU (총 Penicillin G로서 125,000IU)
- 디히드로스트렙토마이신황산염 (Dihydrostreptomycin Sulfate) 125,000IU (Dihydrostreptomycin으로서 125mg)

포장단위 100mL

효능 및 효과

- 가. 페니실린과 스트렙토마이신 감수성 세균에 항균효과를 발휘하며 특히 소, 돼지, 개, 고양이의 다음과 같은 질병에 치료 효과
- 나. 기관지 폐렴, 방광염, 돼지 인플루엔자, 망아지의 관절감염, 개디스템퍼, 송아지 디프테리아, 송아지 백리, 송아지 폐렴, 고양이 디스템퍼, 렙토스피라증, 리스테리아증, 신우신염, 돈단독, 상처의 화농, 방선균증

용법 및 용량

- 가. 개, 고양이 : 피하 또는 근육주사
- 나. 소, 돼지 : 근육주사
- 다. 투여량

축종	투여량
소	4.0mL / 100kg
송아지, 성돈	3.0mL / 50kg
자돈, 개, 고양이	0.5mL / 5kg

라. 주사 후 3일간 효력이 지속하므로 필요한 경우에는 3일 후 재투여합니다.
마. 주사 부위 한 곳에 소는 10mL, 돼지는 5mL, 개와 고양이는 1mL가 넘지 않게 투여합니다.

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 휴약기간은 다음과 같습니다.
 - 소, 돼지 : 50일
 - 우유 : 17일
- * 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축산물 내에 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
- * 제품을 충분히 흔들어서 사용하시고 만일 균질화되지 않으면 사용하지 마십시오.
- * 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 냉장(2~8°C)에서 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간: 제조일로부터 36개월

