

울트라마이신 (Ultramycin)



울트라마이신은 옥시테트라사이클린을 주원료로 하는 광범위 항생제로서 다양한 질병을 효과적으로 치료하는데 편리하게 사용할 수 있는 수용성 산제입니다.

1) 항균 범위가 넓어 각종 세균 감염증에 광범위하게 적용

옥시테트라사이클린을 주원료로 하여 항균 범위가 넓고 특히 조직액, 임파액, 혈액 등 다양한 장기에 잘 분포하므로 다양한 부위의 세균 감염증을 치료하는데 효과적으로 사용할 수 있습니다.

2) 물에 잘 녹는 수용성 산제

물에 잘 녹아 투여하기가 간편하며 음수로 투여하므로 사료첨가에 비해 보다 신속하게 치료를 시작할 수 있습니다.

성분 및 함량

본제 1kg중
옥시테트라사이클린
(Oxytetracycline)으로서
120g(역가)

포장단위

1kg

효능 및 효과

옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

가. 소 : 대장균증(*E. coli*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*)

나. 돼지 : 대장균증(*E. coli*), 살모넬라증(*Salmonella choleraesuis*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella multocida*), 렙토스피라병(*Leptospira interrogans serovar Pomona*)

다. 닭 : 마이코플라스마성 관절활막염(*Mycoplasma synoviae*), 만성호흡기병(*Mycoplasma gallisepticum*), 대장균증(기낭염, *E. coli*), 가금콜레라(*Pasteurella multocida*)

용법 및 용량

가. 소, 돼지 : 일일 체중 10kg당 본제 1.8g을 희석하여 7~14일간 음수로 투여합니다.

나. 닭

- 마이코플라스마성 관절활막염 : 일일 음수 L당 본제 0.4~0.9g을 희석하여 7~14일간 음수 투여합니다.

- 만성호흡기병, 대장균증, 가금콜레라 : 일일 음수 L당 본제 0.9~1.8g을 희석하여 7~14일간 음수 투여합니다.

주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축산물 내에 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.

* 휴약기간 : 소/돼지/닭 5일

저장방법/유효(사용)기간

* 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.

* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

