

린탈-10 과립 (Rintal-10 granule)



린탈-10 과립은 장내 기생충에 대해서 우수한 구충력을 발휘하는 광범위 내부 기생충 구제제입니다.

1) 광범위 구충제입니다.
가축의 장내 기생충과 폐충에 대해 효과가 있으며, 조충과 편충에 대해서도 구충효과를 지닌 광범위 구충제입니다.

2) 안전합니다.
실험동물 실험 시, 급성 경구 독성이 낮게 나타났습니다.

3) 기호성이 좋습니다.
가축에 기호성이 좋으며 체내흡수 및 배설이 신속하게 이루어집니다.

성분 및 함량

본제 1kg중
페반텔(Febantel) 100g

포장단위
100g

효능 및 효과

가축의 각종 장내 기생충, 폐충, 조충, 편충 및 가금의 장내 기생충에 대한 구충가. 소

- *Dictyocaulus viviparus*(우폐충), *Ostertagia ostertagi*(오스테르타그씨위충), *Haemonchus contortus*(염전위충), *Trichostrongylus Axei*(투명모양선충), *Cooperia oncophora*(쿠포모양선충)

나. 돼지

- *Strongyloides ransomi*(란숨간충), *Metastrongylus rubidus*(돈폐충), *Desophayostomum spp.*(장결절충속), *Ascaris suis*(돈회충), *Trichuris suis*(돈편충)

다. 닭

- 란숨간충, 편충, 적색위충 등에는 프리믹스를 장기간 투약하는 것이 효과적

라. 말, 면양, 산양, 야생동물 : 체중 kg당 50mg

용법 및 용량

필요한 양을 사료에 섞어서 투여합니다.

가. 소 : 체중 kg당 75mg

나. 돼지

- 100kg 이하일 때 : 체중 kg당 50mg
- 100kg 이상일 때 : 체중 kg당 75mg

다. 닭 : 체중 kg당 250mg

라. 말, 면양, 산양, 야생동물 : 체중 kg당 50mg

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 투약 후 24시간 이내에는 도축을 금합니다.
- * 본 제품은 동물용 의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- * 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- * 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

