

# 세바실 푸어-온 (Sebacil pour-on)



**성분 및 함량**  
본제 1L중  
포aksim VL(Phoxim VL)  
.....84.27g  
(Phoxim으로서 75g)

**포장단위**  
1L

세바실 푸어-온은 돼지의 옴, 돼지 이 등 외부기생충 구제 및 귀 진드기의 감소 등의 목적으로 편리하게 사용할 수 있는 제품입니다.

- 1) 편리합니다.
- 2) 민감한 임신 모돈에 스트레스를 유발하지 않습니다.
- 3) 돼지 옴과 이를 빠르고 효과적으로 제거합니다.
- 4) 계절과 온도에 상관없이 연중 사용 가능합니다.

### 효능 및 효과

가. 대상동물 : 돼지  
나. 돼지의 옴(*Sarcoptes scabiei* var. *suis*)과 이(*Haematopinus suis*)의 치료

### 용법 및 용량

가. 본제를 투약기로 정확히 계량하여 돼지 체중 10kg당 4mL를 등의 정중선을 따라 머리부터 꼬리까지 일정하게 부여줍니다.

기준체중(kg)	본제 사용량(mL)
10	4
50	20
100	40
150	60

- 나. 150kg 이상의 돼지는 권장 투약비에 맞게 계산하여 투여합니다.
- 다. 돼지 이의 치료시 체중 10kg당 4mL를 1회 투여합니다.
- 라. 돼지 옴의 치료시 체중 10kg당 4mL를 투여하고 2주 후 한번 더 투여합니다.
- 마. 심한 귀진드기 감염시 양쪽 귀 안으로 1~2mL 투여합니다.
- 바. 돼지 이의 치료는 둔근 단위로 실시하는 것이 중요하고 적당한 속도가 선행되어야 합니다.

### 주의사항

- \* 휴약기간 : 돼지 19일
- \* 친환경 농가에서는 본 제품의 사용을 금지합니다.
- \* 유기인제 또는 본제품의 성분에 과민반응을 보인 경우는 사용하지 마십시오.
- \* 본 제품은 수중생물, 조류, 벌 등에 매우 독성이 있으므로 주의하십시오.
- \* 본 제품의 투여 10일 전후로 다른 콜린에스테라제 억제제, 페노다이하진, 근육이완제를 투여하지 마십시오. 마취제의 병용도 피하십시오.
- \* 과량투여시 유연, 안진증, 설사, 서맥, 근마비, 운동실조, 떨림, 경련, 호흡곤란을 동반한 혼수상태 등이 일어날 수 있습니다. 이러한 경우 체중 kg당 0.1mg의 아트로핀을 근육이나 정맥주사로 투여하십시오. 처치는 증상의 정도에 따라 증상이 없어질 때까지 반복하십시오.
- \* 피부나 눈에 본제품이 닿지 않게 주의하시고 만일 피부에 닿았을 경우에는 비누로 깨끗이 씻어내십시오.
- \* 본 제품은 외용제이므로 절대 내용으로 사용하지 마십시오.
- \* 본 제품을 실내에서 사용해야 하는 경우에는 철저히 환기하십시오.

### 저장방법/유효(사용)기간

- \* 1~25℃ 이하에서 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

