



어드밴티क्स®

advantix® for Dog



■ 허가번호 제21-34호

■ 원료약품 및 분량(본제 100ml 중)

| | |
|--|--------|
| 이미다클로프리드(Imidacloprid, 별규) | 10,00g |
| 페메스린(Permethrin, 별규) | 50,00g |
| 메틸피롤리돈(N-Methylpyrrolidone, EP) | 48,40g |
| 미글리올 812(Miglyol 812, EP) | 5,00g |
| 구연산(Citric Acid, EP) | 0,10g |
| 부틸히드록시톨루엔(Butylhydroxytoluene, EP) | 0,10g |

■ 효능 및 효과

대상동물 : 개

- 진드기(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) 감염의 예방과 치료
- 벼룩(Ctenocephalides spp.) 감염의 예방과 치료
- 모기, 눈에 날이(sand fly)의 물림 예방(Leishmaniosis 예방)

■ 용법 및 용량

본제의 용량을 다음과 같이 체중에 따라 달리하여 월 1회 도포하십시오.

| 체중별(kg) | 용량(ml) | 비 고 |
|---------|--------|--------------------------|
| 4이하 | 0.4 | |
| 4~10 | 1.0 | 7주령 미만의 강아지에는 사용하지 마십시오. |
| 10~25 | 2.5 | |
| 25~45 | 4.0 | |

피펫사용방법: 그림과 같이 캡을 분리하여 뒤집어 끼운 뒤 틱 소리가 나오도록 살짝 돌려줍니다.



■ 수입/판매원

바이엘코리아(주)

본사: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23
 공장/창고: 경기도 안산시 단원구 능안로 14
 무료상담전화: 080-500-5998

투여방법: 양쪽 어깨 사이의 목부위 털을 헤치고 정중선을 따라 고리부분으로

내려가면서 피부에 고르게 도포하십시오. 상처 부위에는 바르지 마십시오.

■ 주의사항

[사용방법상의 주의사항]

- 가. 약제가 동물의 입과 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 나. 약제 도포 부위를 동물이 핥지 않도록 주의하십시오. 다. 사용 후 남은 액체와 용기를 폐기, 액제가 하천에 유입되지 않도록 주의하십시오. 라. 7주령 이하의 어린 강아지에는 사용하지 마십시오.

마. 고양이에는 절대 사용하지 마십시오.

- 바. 식용동물에는 사용하지 마십시오. 사. 도포 부위에 피부반응이 있을 경우 사용을 중지하고 수의사와 상의하십시오.



[취급자 주의사항]

- 가. 피부, 눈 및 입에 약제가 묻지 않도록 주의하십시오. 나. 피부에 닿으면 즉시 비누와 물로 깨끗이 씻어내십시오. 다. 피부감각성이 있는 사람은 본 약제에 매우 민감할 수 있습니다. 라. 눈에 들어갔을 경우 물로 깨끗이 행귀내십시오. 마. 약제 사용 후 자극증상이 나타나는 경우 사용설명서를 의사에게 보이고 진찰을 받으십시오. 바. 사용 후 남은 약제와 용기는 하수구에 들어가지 않도록 적절하게 폐기하십시오.

■ 저장방법

실온에서 보관하십시오.

■ 유효기간

제조일로부터 36개월(포장 하단의 표시된 월의 1일까지)

■ 제조원

Bayer Animal Health GmbH
 (KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH)
 Projensdorfer Straße 324 D24106 Kiel, Germany

■ 구입문의 (주)벨벳 (02)478-1440

바이엘 Bayer

Made in Germany 57548170 개정: 1511-00,01

어드밴티क्स®는 동물병원에서 구입할 수 있습니다.