

저멕스 (Germex)



저멕스는 계사/우사/돈사 및 부속기구의 소독과 기타 농장, 실험실, 동물원 등의 기구를 소독합니다.

- 1) 병원성 미생물을 빠른 시간내에 살멸합니다.
- 2) 강력한 계면활성작용으로 소독 효과를 증진시킵니다.

■ 효능 및 효과

- 가금의 음료수 소독으로 각종 질병 예방
- 계사, 우사, 돈사 및 부속기구의 소독
- 부화장의 소독
- 기타 농장, 실험실, 동물원 등의 기구 소독

성분 및 함량

본제 1L중
 농염화벤잘코늄액 50
 (Benzalkonium Chloride
 Concentrated Solution 50)
 400g
 (Benzalkonium Chloride로
 서 200g)

포장단위
 18L

■ 용법 및 용량

음료수에 넣어 먹이거나 축사 및 기구소독은 물에 섞은 다음 분무 살포하거나 이 용액에 침적 소독합니다.

- | | |
|----------------------------|--|
| 가. 축사의 표면 소독 | 물 10L당 20~40mL(1:250~1:500) |
| 나. 닭의 음료수 소독 | 음료수 100L당 30mL(1:3300) |
| 다. 유방 소독 | 물 10L당 10mL(1:1000) |
| 라. 종란 소독 | 43~46°C의 물 10L당 10mL를 넣어 종란을 침적 소독(1:1000) |
| 마. 기구 소독(부화장, 동물원, 축산농가 등) | 물 10L당 20mL(1:500) |

■ 주의사항

- * 취급 시 장갑, 마스크, 보호 안경, 보호의 등 보호 장구를 착용하고, 취급 후 사용자는 몸을 깨끗이 씻으십시오.
- * 반드시 원액을 별도의 용기에 미리 1차 희석한 후 물탱크에 혼합하십시오.
- * 약효 및 안전상에 문제가 발생할 수 있으므로 다른 약품과는 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
- * 유기 물질(분뇨, 오물, 사료 찌꺼기 등)이 있는 경우 소독 효과가 떨어질 수 있으니 먼저 유기 물질을 제거하고 난 후에 소독하십시오.
- * 양어장에서 물고기가 들어있는 상태에서는 폐사가 발생할 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.
- * 음수 백신의 효능에 이상을 초래할 수 있으므로 양계 농가에서는 백신 접종일 전후 2일씩을 포함한 총 5일간 음료수 소독을 중지하십시오.

■ 저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30°C)에 세워서 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

